

Abb. 2: Rotation der Chloracetamid-Herbizide auf der Maisanbaufläche (Beratungsempfehlung Niedersachsen)

1. Jahr
S-Metolachlor

z. B.
Elumis Extra Pack
Zintan Platin Plus
Pack*

2. Jahr
Pethoxamid

z. B.
Principal S Pack
Successor Top 2.0
Pack*

3. Jahr
Flufenacet

z. B.
Laudis
Aspect Pack*

4. Jahr
Dimethenamid-P

z. B. Spectrum
Gold Triple Pack
Spectrum Gold
Duo Pack*
Spectrum Aqua Pack*

oder chloracetamidfreie Herbizide (Alternativen)

z. B. Lido SC Callisto Pack (Terbuthylazin)
Elumis P Pack
Arigo B Pack
Artett-Kelvin Pack

* evtl. + Gräsersulfonyle z. B.:

Motivell forte**	0,4
Samson 4 SC**	0,5
Nicogan**	0,5
Kelvin**	0,5
Principal**	50 g
Cato/Escep	20 g

Bei Sulfonylzusatz (z. B. gegen Borstenhirse, Risse) das Basisherbizid um 25 % reduzieren; Verträglichkeit beachten!

** Achtung: Nur alle zwei Jahre auf derselben Fläche anwenden!