



Mit Adengo (Wirkstoffe Isoxaflutol (225 g/l) und Thiencarbazon (90 g/l)) steht ein Herbizid für den Voraufbau (VA) bis maximal im 3-Blatt-Stadium zur Ver-

fügung. Die beste Wirkung wird im VA erzielt. Damit kann kostengünstig und arbeitswirtschaftlich eine Herbizidvorlage erfolgen und dann gezielt im Nachaufbau (NA) nachbehandelt werden. Vorteilhaft ist ein Einsatz vor angekündigten Niederschlägen, sodass die ausgeprägte Bodenwirkung im VA dann voll ausgespielt wer-

den kann. Aufwandmenge 0,25–0,33 l/ha. Gute Wirkungen werden im VA gegen Hirsen und Unkräuter, vor allem Knöteriche, Nachtschatten und Storchschnabel erzielt. Der Einsatz in Spritzfolge mit z. B. Adengo 0,3 l/ha VA gefolgt von Laudis 2,0 l/ha in BBCH 14–16 wird empfohlen.

Herbizide im Mais

Hirseproblemstandorte mit Hühnerhirse, Finger-Fadenhirse und Borstenhirse, Mischverunkrautung mit Nachtschatten			
Anwendungsbereich	Herbizidempfehlung	Aufwandmenge l/kg/ha	Bemerkungen/Notizen
2.-4. Blatt des Mais	Laudis Aspect Pack Laudis + Aspect	2,0 1,5	
	Zintan Platin Pack Dual Gold + Calaris	1,5 1,25	
	Zintan Saphir Pack Spectrum Gold + Callisto	2,0 0,8	Schwäche Borstenhirse:
	Spectrum Gold + Botiga oder + Nagano	2,0 1,0 1,0	+ Motivell* forte 0,5 l/ha oder + Nicogan* 0,8 l/ha oder + Ikanos* 0,8 l/ha + Primero* 0,8 l/ha
	Successor Top 3,0 Successor T + Border	3,0 0,75	
VA- 3-Blattstadium Mais	VA Adengo 4.-6. Blatt Laudis	0,25–0,33 2,0	Ausreichende Bodenfeuchtigkeit erforderlich
Hirsestandorte, Mischverunkrautung und Gräser (Flughäfer, Ackerfuchsschwanz). Bodenwirkung gegen Gräser			
2.-4. Blatt des Mais	MaisTer power + Aspect	1,25–1,5 + 1,25–1,5	
	Elumis Gold Pack Elumis* Gardo Gold	1,25 2,5	
	Gardo Gold + Elumis P*	2,5 1,25 + 0,02	Elumis P* auch gegen Ampfer und Knöteriche
	Principal S Pack Principal* + Successor T + Trend	0,075 2,5 0,25	Schwäche Nachtschatten: + B235* 0,3–0,5 l/ha oder + Calisto 0,5 l/ha
	Arigo* + Trend + Successor T	0,3 + 0,3 2,5	Auch gegen Nachtschatten und Knöteriche
	Zingis + Mero + Spectrum Gold	0,25 + 1,75 2,0	
	Diniro + Adigor + Successor T	0,4 + 1,2 3,0	Auch gegen Winde und Windenknöterich
	Elumis + Arrat + Dash + Spectrum	1,0 0,2 + 1,0 0,8–1,0	Auch gegen Storchschnabel, TBZ frei
	Gardo Gold + Task + FHS	2,5 + 0,3 + 0,25	Auch gegen Ampfer, Winde, Disteln
	Motivell Komplett P. Motivell forte* + Simba 100 SC + Successor T	0,6 1,0 2,5	
Mischverunkrautung und Gräser (Quecke, Flughäfer, Ackerfuchsschwanz). Keine Bodenwirkung gegen Hirsen.			
2.-4. Blatt des Mais Bei Gräsermitteln unbedingt die Sortenverträglichkeit beachten	MaisTer power	1,25–1,5	Bei Quecke: 1,5 l/ha MaisTer power
	Elumis P* + Calaris	1,25 + 0,02 1,25	Bei Quecke: + 0,12 l/ha Motivell forte**
	Zeagran Ultimate + Cato* + Trend	1,5 0,03 + 0,2	Bei Quecke 50 g/ha Cato im Splitting
	Nagano + Ikanos*	1,0 1,0	Bei Quecke: 1,0 l/ha Ikanos*
	Zeagran Ultimate. + Kideka + Ikanos*	1,0 1,0 + 1,0	
Mischverunkrautung			
2.-4. Blatt des Mais	Zeagran Ultimate +Kideka oder + Callisto oder + Daneva** oder + Laudis	1,0 1,0 1,0 1,0 1,5	Vorteile bei Nachtschatten
	Calaris	1,25 (1,5)	Vorteile bei Nachtschatten
	Zeagran Ultimate	1,5–2,0	Vorteile bei Nachtschatten
2.-3. Blatt Mais 5.-6. Blatt Mais	Onyx + Simba 100 SC Onyx + Simba 100 SC	0,75 + 0,75 0,75 + 0,75	

* Enthält Nicosulfuron: Im folgenden Kalenderjahr keine Anwendung von Präparaten mit dem Wirkstoff Nicosulfuron. Sortenverträglichkeit bei allen Tankmischungen beachten!

** Daneva kann auch im Splittingverfahren eingesetzt werden. Dann 2 x 0,75 l/ha.