

**Tab. 2: Auswahlparameter für Spitzfolge oder Einmalbehandlung**

Spritzfolge (vorteilhaft)	Einmal-Behandlung
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bei früher Aussaat aufgrund eines verspäteten Reihenschlusses</li> <li>2. auf humusreichen Standorten</li> <li>3. bei starkem Vorkommen von Storchschnabel oder Hirsearten</li> <li>4. erste Behandlung in BBCH 11–13 (1- bis 3-Blatt-Stadium) der Kultur mit circa 30 bis 50 % der zugelassenen Aufwandmenge</li> <li>5. gezielte Nachbehandlung in BBCH 15–16 (5- bis 6-Blatt-Stadium)</li> <li>6. Kombinationen mit Hackmaßnahme möglich</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bei mittlerer bis später Aussaat (schneller Reihenschluss)</li> <li>2. auf Standorten mit leicht bekämpfbarer Verunkrautung, die bei Bekämpfung mit blattaktiven Mitteln erfasst werden (Gänsefußarten, Vogelmiere, Stiefmütterchen)</li> <li>3. Behandlungen etwa im Stadium BBCH 14 (4-Blatt-Stadium) der Kultur</li> <li>4. Aufwandmengen 50 bis 75 % der zugelassenen Aufwandmenge</li> <li>5. Storchschnabel und Schadhirsen werden möglicherweise nicht ganz vollständig erfasst und schwer bekämpfbare Biotypen könnten möglicherweise selektiert werden</li> </ol>