

Abb. 3: Herbizidempfehlungen gegen Hirsearten und Mischverunkrautung 2020

(Einmalbehandlung mit voller Aufwandmenge in BBCH 12–14 oder als **Splittingbehandlung mit reduzierter Vorlage zu BBCH 11–13 und Nachlage in BBCH 15–18**)

Laudis Aspect Pack

Laudis 1,8–2,0 + Aspect 1,35–1,5
(+ B 235 0,1–0,2)

Spectrum Aqua Pack

Spectrum Gold 1,25–1,4
+ Stomp Aqua 2,5–2,8 (+ B 235 0,2)

Zintan Saphir Pack

Spectrum Gold 2,0
+ Callisto 0,8–1,0 (+ B 235 0,3**)

Successor Top 2.0

Successor T 2,4–3,0
+ Callisto 0,75 (+ B 235 0,3**)

Zintan Platin Pack

Calaris 1,25–1,5
+ Dual Gold 1,0–1,25 (+ B 235 0,3**)

MaisTer power Spectrum Gold

MaisTer power 1,0
+ Spectrum Gold 2,0

Elumis Triumph Pack


Successor T 2,5
+ Elumis 1,25 (+ B 235 0,3**)

MaisTer power Aspect Pack

MaisTer power 1,2–1,5 + Aspect 1,2–1,5

Adengo 0,25–0,33 (+ B 235 0,3**)

MaisTer power 1,25–1,5



Nachlage bei Bedarf:
Sulcogan* 0,75 (+ B 235 0,3 **) oder
Callisto*, Maran*, Boder*
Simba* 100 SC 0,75 (+ B 235 0,3**) (Splitting < 100 g Mesotrione = 1,5 l/ha) oder
Arigo 0,2 + FHS 0,2 oder
Laudis* 1,5 (Splitting < 100 g Tembotrione = 2,25 Laudis)

* = evtl. Gräsersulfonyle zumischen, z. B.:

- Cato 20 g/ha
- Samson 4SC 0,5 l/ha
- Motivell forte 0,4 l/ha
- Nicogan 0,5 l/ha
- Kanos 0,5 l/ha

Auflagen für Nicosulfuron:
Max. alle 2 Jahre anwenden!

Resistenzgefährdete Wirkstoffe wie Flufenact oder ALS-Hemmer (Thien-carbazone, Iodosulfuron, Foramsulfuron, Proofsulfuron, Thifensulfuron, Nicosulfuron und andere Gräser-“Sulfonyle“ nur einmal in der Fruchtfolge sowie in Mischung oder Spritzfolge mit anderen Wirkstoffgruppen (MoA) verwenden.

Eine Zugabe von B235 mit 0,1–0,3 l/ha sichert bei allen Basispacks die Wirkung ab, insbesondere bei Trockenheit.

** Alternativ ist auch Zumischung PEAK 15 g möglich. Bei MaisTer power wird kein Zusatz empfohlen.